



**RESUMEN DE
PROTOCOLOS
de la 2ª Parte**

TESTS DE MICROBIOTA ALTERADOS: Soluciones Nutricionales

Resumen de protocolos – 2ª Parte



Indicaciones: Infecciones, Hongos (Candidas), Parasitosis, Bacterias proteolíticas desbocadas, etc.
Dosis: 2-2-2 ó 3-3-3 según gravedad lejos de las comidas




Indicaciones: Infecciones, Hongos (Candidas), Parasitosis, Bacterias proteolíticas desbocadas, etc.
Dosis: 0-1-1 antes comidas con 50 ml de agua



Indicaciones: Probiótico multitarea que regenera la Microbiota, detiene diarreas, recomendable para balancear durante y tras la toma de antibioterapia, etc.
Dosis: 2-2-2 ó 3-3-3 lejos comidas con 50 ml de agua



Indicaciones: Regularizador del tránsito intestinal (especialmente estreñimiento crónico), regenera la estanqueidad intestinal,
Dosis: 2-2-2 ó 3-3-3 lejos comidas con 50 ml de agua



Indicaciones: Hiperpermeabilidad, diarreas, espasticidad intestinal, etc.
Dosis: 1 cáps "A" + 1 cáps "B" antes de desayuno comida y cena con 50 ml de agua. Durante 5 días.



Indicaciones: Aporta fibras solubles que modulan la Inmunidad Intestinal.
Dosis: 1-0-1 antes comidas con 50 ml. de agua



Indicaciones: Enzimas hidrolíticas o proteolíticas que aumentan la digestibilidad.
Dosis: 1-1-1 o 2-2-2 en medio de las comidas para facilitar digestión

VITAMINOR